

Психиатрия

Статья

«Острое шизофреноподобное психотическое расстройство на фоне COVID-19»

Опубликована в журнале ВАК
Web of Science/Scopus «Medicina» (Литва)

Организация

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатри- ческая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»

Авторы

Лидия Бравве, Мария Кайдан, Георгий Костюк

Аннотация

Предыстория и цели: Исследования в этой области сосредоточены на остром шизофреноподобном психотическом расстройстве, поскольку более половины случаев прогрессируют до хронического течения, проявляющегося как шизофрения или шизоаффективное расстройство. Исследования показали связь между вирусной инфекцией и началом психоза, а также изучается влияние вирусов на клиническое течение заболевания. Следовательно, в случаях, когда этот тип психоза сочетается с вирусным заболеванием, есть убедительные основания для выявления общих черт как в лечении, так и в исходе. Продолжающаяся глобальная пандемия COVID-19 предоставляет уникальную возможность оценить эти изменения. Цель этого исследования двоякая: во-первых, изучить клинические характеристики острого шизофреноподобного психотического расстройства в контексте пандемии, а во-вторых, проанализировать терапевтические вмешательства и результаты. Материалы и методы: Было проведено неинвазивное наблюдательное исследование, в котором 310 пациентов с острым шизофреноподобным психотическим расстройством, поступивших в качестве стационарных пациентов в психиатрическую больницу, были разделены на две группы в зависимости от наличия COVID-19 (группа I – F23.2 с COVID-19): 222 пациента; группа II – F23.2 без COVID-19: 88 пациентов). После выписки пациенты обеих групп находились под клиническим наблюдением на амбулаторном лечении в течение 36 месяцев. Результаты: Результаты показали, что острое шизофреноподобное психотическое расстройство, связанное с COVID-19, характеризовалось большей выраженностью продуктивных симптомов и включением темы пандемии в психотические симптомы. Этим пациентам давали более высокие дозы антипсихотических препаратов.

Выводы: Исход этого типа психоза является последовательным, независимо от перенесенной в начале заболевания инфекции, и характеризуется хроническим течением с преимущественным переходом в шизофренический процесс.