

Хирургия

Представлен структурированный подход к современному лечению язвенных кровотечений

Статья

«Язвенные гастродуоденальные кровотечения с высоким риском рецидива. Тактика лечения»

Опубликована в журнале ВАК «Московский хирургический журнал» (Российская Федерация)

Организация:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы

Авторы:

В. В. Бедин, И. Ю. Коржева, А. В. Власенко, Г. С. Михайлянц, В. А. Цуркан, Д. С. Бочарников, К. А. Соколов

Аннотация

Острое язвенное кровотечение по-прежнему является основной причиной госпитализации. В этом обзоре представлен структурированный подход к современному лечению язвенных кровотечений и освещена стратегия в ситуациях, когда имеется высокий риск их рецидива. Рассматриваются первоначальные методы лечения – фармакотерапия и эндоскопия, а также стратификация риска, хирургическое вмешательство и рентгенэндоваскулярная эмболизация, критически обсуждается их роль в лечении язвенных кровотечений с высоким риском рецидива. Освещена перспектива в отношении профилактической рентгенэндоваскулярной эмболизации. Помимо достижений фармакотерапии и эндоскопии, лечение кровотечений с высоким риском рецидива остается сложной задачей. Когда эндоскопия не эффективна и кровотечение не прекращается или рецидивирует, для его купирования показаны хирургические и рентгенологические методы. Хирургическое лечение эффективно, но оно по-прежнему связано с более высокой инвалидизацией, длительным пребыванием в больнице и летальностью. Артериальная эмболизация рекомендуется в качестве альтернативы хирургическому вмешательству и чаще заменяет хирургическое лечение у пациентов с тяжелым коморбидным фоном. Пациенты с данной проблемой часто относятся к пожилой и старческой возрастным группам, что связано с тяжелым коморбидным фоном и, следовательно, требует мультидисциплинарного подхода в лечении. Алгоритм лечения нуждается в четких критериях рисков и в структурированном лечебном подходе из-за более высокой заболеваемости и смертности по сравнению с обычным язвенным кровотечением. Кроме того, многообещающий подход профилактической эмболизации при язвенной болезни с высоким риском рецидива требует дальнейшего изучения.

Полные реквизиты статьи для цитирования: Язвенные гастродуоденальные кровотечения с высоким риском рецидива. Тактика лечения / В. В. Бедин, И. Ю. Коржева, А. В. Власенко [и др.] // Московский хирургический журнал. – 2025. – № 2. – С. 200–212. – DOI 10.17238/2072-3180-2025-2-200-212. – EDN AYAEGQ.